

疫苗	種類	0歲	6週	2個月	3個月	4個月	5個月	6個月	7個月	8個月	9~11個月	12~15個月	16~17個月	18~23個月	2歲	3歲	4歲	5歲	6歲	7歲	8歲	9歲	10歲以上		
b 型流感嗜血桿菌	滅活疫苗			①	②	③	注意、出生後七個月內接種第一劑者注射數和規則會改變					④	一歲以後第四次接種												
肺炎鏈球菌 (PCV13)	滅活疫苗			①	②	③	間隔四週					④													
B 型肝炎	標準			① ② 間隔二十週 (大概五個月) ③											與第一次間隔二十週。注意、只第三次乙型流感嗜血桿菌 (HIB)、肺炎鏈球菌有時候不可同時接種										
	母子感染預防	①	②	接種到出生後到十四週六日							③														
輪狀病毒	1 价			①	②																				
	5 价			①	②	③	擇一接種。接種完第一劑後不可更改																		
四联 (DPT-IPV)	滅活疫苗			自由選擇、至少四次			至少間隔三週。			如果間隔四週、容易和乙型流感嗜血桿菌 (HIB)、肺炎鏈球菌同時接種															
3 種混合 (DTap) 白喉、破傷風、非細胞性百日咳混合疫苗 + 小兒麻痺症 / 急性無力肢體麻痺	滅活疫苗			①	②	③	間隔至少六個月。最好間隔一年。					④	(到七、五歲)												
白喉、破傷風混合疫苗 (DT)	滅活疫苗																						11歲 ① 12歲		
卡介苗 (BCG)	活疫苗	未滿三個月不可接種			① 推薦接種出生後五個月以上																				
麻风二联 (MR)	活疫苗												①										②		
水痘	活疫苗											①	間隔三個月	②											
腮腺炎	活疫苗													①									② 推薦兩次都和 MR 同時接種		
日本腦炎	滅活疫苗																						① 也有出生後六個月就可開始定期接種的地區		
流行性感冒 / 流感	滅活疫苗																						① ② 每年 (十月、十一月左右)		
人類乳突病毒 (HPV)	滅活疫苗																						① 從十三歲開始接種		

定期接種的推薦期間

定期接種可能的期間

任意接種的推薦期間

任意接種可能的期間

可能用健康保險的時期

